

Effecsant[®] HPP

محلول ضد عفونی کننده ی ضد ویروس، ضد باکتری
و ضد قارچ بر پایه پراکسید هیدروژن
و پراستیک اسید



Unique Solution For
All Pollution



ترکیبات

هر یک لیتر از محلول حاوی:

- پراکسید هیدروژن ۲۵۰ گرم
- پراستیک اسید ۵۰ گرم

موارد مصرف

افکسان اچ.پی.پی[®] یک ضد عفونی کننده بسیار قوی با طیف اثر وسیع بر روی انواع میکروارگانیسم ها از جمله باکتری ها، ویروس ها، کپک ها و مخمرها می باشد. بر اساس طبقه بندی FDA و EPA این ترکیب دارای اثر استریلیزاسیون می باشد. افکسان اچ.پی.پی[®] به علت قدرت اثر قوی ضد عفونی و نیز امنیت زیستی بالا جهت ضد عفونی اختصاصی مزارع پرورش دام و طیور مورد استفاده قرار می گیرد.

مکانیسم اثر

در این ترکیب پراکسید هیدروژن اثر اکسید کنندگی بسیار قوی بر روی تمامی میکروارگانیسم ها دارد. خاصیت ضد میکروبی پراستیک اسید در این ترکیب سطح امنیت زیستی را بالا برده و به همراه پراکسید هیدروژن ترکیب بسیار قوی با اثر وسیع بدون ایجاد مقاومت میکروبی را ایجاد می نماید. پراستیک اسید پروتئین ها و آنزیم های موجود در میکروارگانیسم ها را اکسید و غیرفعال می کند. با اکسیداسیون پیوندهای پروتئینی، دیواره سلولی میکروارگانیسم پاره شده و به علت اکسیداسیون آنزیم ها، فعالیت داخل سلولی مختل می گردد. این ترکیب به علت ایجاد تنوع بالای واکنش های شیمیایی در میکروارگانیسم ها هیچگونه مقاومت میکروبی ایجاد نمی کند.

مقدار و روش مصرف

- ضد عفونی هوای سالن در حضور جوجه: به نسبت ۱ به ۱۰۰۰ (۱۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب) اسپری شود.
- ضد عفونی سطوح سالن ها: به نسبت ۱ به ۴۰۰ (۲۵۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب) رقیق شده، سپس بر روی سطوح اسپری یا اسفنج کشی گردد.
- ضد عفونی لوازم و تجهیزات: به نسبت ۱ به ۲۰۰ (نیم لیتر در ۱۰۰ لیتر آب) رقیق شده، سپس به شکل غوطه وری استفاده شود.
- ضد عفونی خوراک: به نسبت ۱ به ۱۰۰۰ رقیق شده، سپس بر روی خوراک اسپری شود.
- ضد عفونی آب آشامیدنی: به نسبت ۱ به ۲۰۰۰۰ رقیق شده و به آب آشامیدنی اضافه شود.
- ضد عفونی حوضچه های ورودی به نسبت ۱ به ۴۰۰ رقیق شده و در حوضچه ها استفاده شود.
- ضد عفونی لاشه گوشت در کشتارگاه: به نسبت ۱ به ۲۵۰ رقیق و به صورت اسپری بر روی لاشه مورد استفاده قرار گیرد.
- ضد عفونی سیستم شیردوشی و مخازن حمل شیر: به نسبت ۱ به ۲۵۰ یا ۱ به ۳۵۰ رقیق شده، سپس در داخل سیستم به گردش در آید.
- ضد عفونی پستان گاو: به نسبت ۱ به ۳۵۰ تا ۵۰۰ رقیق شده، سپس به صورت اسپری استفاده شود.
- ضد عفونی سم برای پیشگیری از لنگش: به نسبت ۱ به ۴۰۰ رقیق شده و به آب اضافه شود، سپس بر روی سم اسپری شود. و یا سم به مدت ۵ - ۱ دقیقه داخل حوضچه حاوی ضد عفونی کننده غوطه ور بماند.

نکته: افکسان اچ.پی.پی[®] در حضور حیوان زنده قابل استفاده می باشد.

احتیاطات

- هنگام استفاده از محصول، با پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک از پوست و چشم محافظت گردد.
- در صورت تماس با پوست و چشم بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.
- این محصول قابل اشتعال می باشد، بنابراین از مجاورت با منابع گرمایی و مواد آتش زا خودداری گردد.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- گالن افکسان اچ.پی.پی[®] به صورت ایستاده و در محل خنک (در دمای کمتر از ۲۰°C) و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب گالن پس از هر بار استفاده، کاملاً بسته شود.
- درب این محصول دارای سوپاپ محافظ جهت تخلیه گاز می باشد.
- پس از باز شدن درب ظرف، محصول در طول مدت ۶۰ روز مصرف گردد.
- محلول رقیق حداکثر تا ۴۸ ساعت قابل استفاده می باشد.

شرایط نگهداری

بسته بندی

گالن ۵ لیتری



تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور
تولیدکننده: شرکت ویواپارس، ایران

تحت لیسانس کمپانی UNIQURE، اسپانیا

آدرس: استان البرز، شهرک صنعتی نظرآباد

تلفن: ۰۲۱-۶۶ ۱۳۱ ۱۳۱

www.vivapars.com