

Virover[®]

محلول ضد عفونی کننده با دامنه ی عملکرد وسیع
بر پایه آلدهیدها و ترکیبات چهارتایی آمونیوم

Unique Solution For
All Pollution



ترکیبات

هر یک لیتر از محلول حاوی:

- دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید ۲۰ گرم
- فرمالدهید ۳۰ گرم
- گلوکار آلدهید ۶۰ گرم
- بنزالکونیوم کلراید ۵۰ گرم

موارد مصرف

- ضد عفونی هچری ها در کارخانه های جوجه کشی
- ضد عفونی حوضچه های ورودی سالن های مرغداری
- ضد عفونی سالن های مرغداری، قفس ها و لوازم مرغداری (دانخوری ها، آبخوری ها و...)
- ضد عفونی حوضچه های ورودی وسایل نقلیه و عبور دام در مزارع پرورش دام
- ضد عفونی جایگاه نگهداری دام ها، زایشگاه، گوساله دانی و بیمارستان ها
- ضد عفونی کامیون های حمل و نقل
- ضد عفونی کفیوش ها، چکمه ها و سایز لوازم مورد استفاده در دامداری و مرغداری

مکانیسم اثر

دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید جدیدترین عضو از گروه ترکیبات چهارتایی آمونیوم بوده و به علت فقدان حلقه بنزنی نسبت به سایر ترکیبات این گروه پایدارتر می باشد. این ترکیب با تاثیر بر دیواره سلولی باعث رسوب سیتوپلاسم شده و نفوذ ترکیبات آلدئیدی را به دیواره سلولی میکروارگانیسم ها تسهیل می نماید. ترکیبات آلدئیدی در این محصول موجب اختلال در سنتز RNA و DNA، کوآگولاسیون و تخریب پروتئین میکروارگانیسم ها می گردند. ویروور[®] بر روی طیف وسیعی از باکتری ها، اسپورها، قارچ ها، مخمرها، جلبک ها و ویروس ها موثر می باشد.

مقدار و روش مصرف

- ابتدا ویروور[®] را بر اساس شدت آلودگی در رقت های زیر آماده و سپس مطابق دستور العمل استفاده نمایید:
- قارچ کشی: نیم لیتر از ویروور[®] را به ۹۹/۵ لیتر آب اضافه کنید.
- باکتری کشی: ۷۵۰ میلی لیتر از محلول را به ۹۹/۲۵ لیتر آب اضافه کنید.
- ویروس کشی: یک لیتر از محلول را به ۹۹ لیتر آب اضافه کنید.
- سپس ۲۰۰ - ۱۰۰ میلی لیتر از محلول آماده شده بر روی یک متر مربع از سطوح اسپری گردد.

احتیاطات

- هنگام استفاده از محصول، با پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک از پوست و چشم محافظت گردد.
- از آشامیدن این محصول و استنشاق بخارات و ذرات اسپری آن پرهیز نمایید.
- این محصول برای پوست، چشم و غشاهای مخاطی حساسیت زا می باشد. در صورت تماس، بلافاصله با آب تمیز و فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- در محل خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب گالن پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود.
- پس از باز شدن درب گالن، محصول حداکثر تا ۶۰ روز مصرف گردد.
- محلول رقیق شده حداکثر تا ۴۸ ساعت قابل استفاده می باشد.

شرایط نگهداری

بسته بندی
گالن ۵ لیتری



تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور

تولیدکننده: شرکت ویواپارس، ایران

تحت لیسانس کمپانی UNIQCURE، اسپانیا

آدرس: استان البرز، شهرک صنعتی نظرآباد

تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱

www.vivapars.com