

# Ultra<sup>®</sup>X

اولتراکس مایع  
ضد ویروس، ضد باکتری  
و ضد قارچ



- پیشگیری و کمک به درمان بیماری های تنفسی و ویروسی، باکتریایی و قارچی گله های طیور
- کنترل واکنش های پس از واکسیناسیون
- محرک رشد
- کمک به درمان آنتریت نکروتیک، مایکوپلاسموز، کلی باسیلوز و اسهال باکتریایی
- پیشگیری و کمک به درمان سالمونلوز

## استفاده به صورت اسپری در حضور گله

توضیحات	دوز توصیه شده (میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب)	موارد مصرف
۱۲ ساعت پس از واکسیناسیون با واکسن زنده به مدت حداقل ۳ روز متوالی ۲ بار در روز استفاده شود.	۱۰۰	کنترل واکنش های پس از واکسیناسیون
۲ الی ۴ بار در روز. به مدت حداقل ۴ الی ۵ روز استفاده از اولتراکس <sup>®</sup> به روش اسپری بایستی در شرایط خاموش بودن هیترها و هواکش های سالن و با قطرات مناسب از فاصله ۳۰ سانتی متری سر پرنده و در تمام سالن صورت گیرد.	۱۰۰	کمک به درمان بیماری های تنفسی، ویروسی و باکتریایی
علاوه بر استفاده از داروهای ضد میکوپلاسمایی (تیلوالوزین، انروفلوکساسین و نورفلوکساسین) اولتراکس <sup>®</sup> را به مدت ۳ تا ۵ روز اسپری نمایید.	۱۰۰	درمان کمکی در گله های مشکوک به MG/MS

**اولتراکس<sup>®</sup> ۲۴ ساعت قبل و تا ۱۲ ساعت بعد از واکسیناسیون نباید مصرف شود.**

## استفاده در آب آشامیدنی

توضیحات	دوز توصیه شده (میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب)	موارد مصرف
تجویز اولتراکس <sup>®</sup> به تنهایی و یا همراه با آنتی بیوتیک ها در ۳ تا ۵ روز اول زندگی در موارد وجود سابقه بیماری با دز ۲۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب توصیه میشود.	۱۰	ورود جوجه ها به گله
۱۲ ساعت پس از واکسیناسیون با واکسن های زنده تنفسی همچون نیوکاسل و برونشیت به مدت حداقل ۳ روز متوالی مصرف شود. اولتراکس <sup>®</sup> نباید ۲۴ ساعت قبل و تا ۱۲ ساعت بعد از واکسیناسیون استفاده شود.	۱۰	کنترل و پیشگیری واکنش های پس از واکسیناسیون
مدت ۴-۵ روز متوالی به همراه آنتی بیوتیک	۲۰	درمان کمکی بیماری های تنفسی
دز موثر در مرغ مادر، اجداد و گوشتی: ۲۰-۳۰ میلی لیتر/۱۰۰ لیتر دز موثر در مرغ تخمگذار: ۳۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر	۲۰-۳۰	کنترل اسهال غیر اختصاصی
حداقل به مدت ۳ تا ۷ روز	۳۰	درمان کمکی کلی باسیلوز
جایگزین محرک های رشد آنتی بیوتیکی نظیر آویلامایسین و فلاوومایسین	۱۰	محرک رشد
به مدت ۳ تا ۵ روز در جوجه یک روزه	۸۰	عفونت بند ناف
دز پیشگیری: ۱۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب به صورت مداوم دز در گله مبتلا: ۲۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب به مدت حداقل ۲۱ روز	۱۰-۲۰	پیشگیری از سالمونلوز
به مدت ۳ تا ۷ روز	۲۰	کمک به درمان آنتریت نکروتیک
همزمان با روش اسپری اولتراکس <sup>®</sup> را به مدت ۳ الی ۵ روز روزانه ۲ نوبت ۸ ساعته همراه با داروهای ضد میکوپلاسمایی (تیلوالوزین، انروفلوکساسین، نورفلوکساسین ...) در آب آشامیدنی استفاده نمایید.	۱۰۰	کمک به درمان گله های مشکوک به MG/MS

## موارد و میزان مصرف جهت ضد عفونی سطوح تخم مرغ نطفه دار

به منظور کاهش آلودگی و نیز افزایش ماندگاری، تخم مرغ ها را پس از جمع آوری در محلول اولتراکس® غوطه ور سازید و یا اولتراکس® را روی آن ها اسپری نمایید.

دز توصیه شده  
(میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب)

موارد مصرف

۶۰	ضد عفونی تخم مرغ نطفه دار
۱۰۰	ضد عفونی تخم مرغ نطفه دار کثیف (شسته شده)
۴۰	ضد عفونی سترها (کف، دیواره، سقف و کانال ها)
۴۰	ضد عفونی سینی ها و سایر تجهیزات هچری
۲۰	ضد عفونی عمومی ساختمان (دیواره، کف، سقف، سالن و تجهیزات)
۸۰-۱۰۰	ضد عفونی هچری ها (جهت پیشگیری از آسپرژیلوس)
۲۰	استفاده در رطوبت سازهای موجود در اتاق خنک کننده
۸۰-۱۰۰	اسپری از طریق نازل ها جهت کنترل آلودگی باکتریایی و قارچی (در ستر و هچر)

**استفاده از اولتراکس® در جوجه کشی، در کاهش آلودگی های باکتریایی و قارچی بسیار موثر است.**

اولتراکس® اسیدیفایر نیست.

اگر چه اولتراکس® حاوی اسیدهای ارگانیک مختلفی است، اما اسیدیفایر نیست و برخلاف اسیدیفایرها، مکانیسم اثر اولتراکس® وابسته به pH یا ترکیبات خوراک نیست.



# UltraX®

موارد مصرف

قابل استفاده به روش اسپری جهت:

- پیشگیری و کمک به درمان بیماری های تنفسی طیور (برونشیت عفونی، آنفلوانزا و نیوکاسل)
- کنترل واکنش های پس از واکسیناسیون

قابل استفاده در آب آشامیدنی جهت:

- پیشگیری و کمک به درمان بیماری های تنفسی (ویروسی، قارچی و باکتریایی) همزمان با روش اسپری
- کنترل واکنش های پس از واکسیناسیون همزمان با روش اسپری
- پیشگیری و کمک به درمان سالمونلوز
- کمک به درمان آنتریت نکروتیک، مایکوپلاسموز، کلی باسیلوز و سایر عفونت های باکتریایی
- محرک رشد طبیعی (فاقد آنتی بیوتیک)

سایر مصارف شامل:

- ضد عفونی تخم مرغ و هچری
- کمک به رفع جراحات سم (گاو)

آنچه اولتراکس را منحصر بفرد می سازد:

- طبقه بندی در گروه مواد کاملاً بی خطر (GRAS)
- سازگار با سایر داروها و افزودنی ها
- عدم ایجاد مقاومت باکتریایی
- فاقد دوره پرهیز از مصرف حتی در زمان استفاده در آب آشامیدنی



*You've got needs  
we've got UltraX!*



تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور

تولیدکننده: شرکت ویواپارس، ایران

تحت لیسانس کمپانی UNIQCURE، اسپانیا

آدرس: استان البرز، شهرک صنعتی نظرآباد

تلفن: ۰۲۱-۶۶ ۱۳۱ ۱۳۱

[www.vivapars.com](http://www.vivapars.com)

