




فلورنیک® ۱۰%

# FLO<sup>R</sup>NIQ<sup>®</sup> 10%

آنتی بیوتیک وسیع الطیف از خانواده آمفنیکل ها

ORAL  
SOLUTION  
ANTIBIOTIC





## فلورنیک<sup>®</sup> ۱۰%

آنتی بیوتیک وسیع الطیف از خانواده آمفنیکل ها

ترکیبات | هر یک لیتر از محلول حاوی: فلورفنیکل ۱۰۰ گرم

### موارد مصرف

پیشگیری و درمان درگیری های گوارشی و تنفسی ناشی از میکروارگانیزم های حساس به فلورفنیکل از جمله گونه های اکتینوباسیلوس، گونه های پاستورلا، گونه های سالمونلا و گونه های استرپتوکوک در طیور.

### مکانیسم اثر فلورنیک<sup>®</sup> ۱۰%

فلورفنیکل در غلظت های پایین باکتریوستات است ولی در غلظت های بالا روی برخی گونه ها، اثر باکتریوسیدی دارد. این آنتی بیوتیک با ایجاد اختلال در فعالیت پپتیدیل ترانسفراز، سنتز پروتئین میکروبی را مهار می کند. از آنجا که تشکیل پیوند پپتیدی مهار می شود، سنتز پروتئین در ریبوزوم های پروکاریوتی و یوکاریوتی (میتوکندری) مهار شده و در نتیجه رشد باکتری متوقف می گردد.





## مزایای فلورنیک<sup>®</sup> ۱۰%

- زیست فراهمی بسیار بالا معادل ۹۶/۵%
- حجم قابل توجه انتشار دارو در بدن، در نتیجه برابر بودن مقدار بافتی و مقدار پلاسمایی آن
- فاقد مضرات و مخاطرات کلرامفنیکل
- اثربخشی بالاتر از کلرامفنیکل
- وسیع الطیف، مؤثر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در بیماری های باکتریایی طیور
- درمان عفونت های تنفسی طیور به علت توزیع بالای فلورفنیکل در دستگاه تنفس طیور
- قابلیت ارزیابی غلظت سرمی فلورفنیکل تا ۲۴ ساعت پس از مصرف خوراکی
- جذب خوراکی سریع و رسیدن به سطح بالای غلظت در بافت های بدن (ریه، کلیه، عضلات روده، قلب، کبد و طحال)
- ایمن بودن دارو به دلیل فاصله زیاد بین دز درمانی و دز سمی

## مقدار و روش مصرف

روزانه ۱ لیتر فلورنیک<sup>®</sup> ۱۰% در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی (معادل ۲۰ میلی گرم فلورفنیکل خالص به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به مدت ۵ - ۳ روز متوالی.

## توجه:

- این محصول نیازی به رقیق سازی اولیه در مقدار کم آب ندارد. جهت جلوگیری از رسوب دارو در آب آشامیدنی، مقدار محاسبه شده از فلورنیک<sup>®</sup> ۱۰% را مستقیماً به مخزن آب آشامیدنی اضافه نمایید.
- در طول دوره ی درمان، آب آشامیدنی حاوی دارو باید طی ۲۴ ساعت مصرف شود.
- مقدار و طول مدت مصرف تحت نظر دامپزشک تعیین گردد.

## منع مصرف

در طیور تخم گذاری که تولید آن ها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

## دوره پرهیز از مصرف

گوشت طیور: ۵ روز

## تداخل دارویی

از مصرف همزمان آنتی بیوتیک فلورفنیکل با سایر آنتی بیوتیک های خانواده پنی سیلین ها، ماکرولید ها و آمینوگلیکوزید ها پرهیز نمایید.

## شرایط نگهداری


- محصول در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب بطری پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود.

## احتیاطات

- تحت نظر دامپزشک مصرف شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- در صورت انقضا محصول، مصرف نشود.
- عمر قفسه ای محصول در صورتی که در بسته بندی اصلی باشد، ۲ سال و در صورت باز شدن درب محصول ۲۸ روز می باشد.

## بسته بندی

بطری ۱ لیتری



# FLO RNIQ<sup>®</sup> 10%

