



Unicocccikill®

ضد عفونی کننده

وسیع الطیف چند منظوره بر پایه فنل
با عملکرد اختصاصی علیه کوکسیدیوز



Unique Solution For
All Pollution

ترکیبات

هر یک لیتر از محلول حاوی:
کلروکرزول ۲۵۰ گرم


کوکسیدیوز یکی از جدی ترین بیماری های صنعت دام و طیور است که توسط تک یاخته گونه های Eimeria ایجاد می شود. شدت این بیماری به فاکتور های مختلفی از جمله سویه کوکسیدیا، تعداد اووسیست های خورده شده، سن، وضعیت سیستم ایمنی میزبان و کیفیت خوراک بستگی دارد. این بیماری موجب خسارات سنگین اقتصادی به صنعت دام و طیور در سراسر جهان می شود.

یونی کوکسی کیل® یک ضد عفونی کننده اختصاصی با فرمولاسیون منحصر به فرد می باشد که حاوی کلروکرزول (دارای تائیدیه از اتحادیه اروپا) است. این محصول علاوه بر اثر کشندگی بر انواع باکتری، قارچ و ویروس، علیه اووسیست های کوکسیدیا، کریپتوسپورییدیوم و انواع تخم کرم ها و تخم جرب قرمز طیور، هاگ باکتری ها و مایکوباکتریوم نیز موثر بوده و حتی در حضور مواد آلی و بیوفیلیم کارایی خود را حفظ می کند.

کلروکرزول یک حلال لیپیدی است که از طریق لایه های سه گانه خارجی محافظت کننده پروتئینی، لیپیدی و کیتینی، وارد تخم کرم و اووسیست های کوکسیدیا می شود. همچنین یونی کوکسی کیل®، موجب از بین رفتن انگل های نابالغ می شود. بدین معنا که تنها یک بار استفاده از این محصول جهت حذف کامل آن ها از محیط کافی است.

موارد مصرف

- ضد اووسیست های کوکسیدیا
- قابل مصرف در فارم های مرغ گوشتی، مادر، پالت، تخم گذار تجاری و مزارع پرورش گوسفند و گاو و پرواربندی ها
- ضد باکتری (مانند سالمونلا، استافیلوکوک، انتروکوک، پروتئوس، سودوموناس و ...)
- ضد ویروس (مانند آنفلوانزا طیور، نیوکاسل و ...)
- ضد قارچ (مانند کاندیدا، آسپرژیلوس و ...)
- ضد تخم های جرب قرمز طیور
- ضد کریپتوسپورییدیوم
- ضد تخم کرم ها



مقدار و روش مصرف

میزان رقت و زمان تماس	موارد استفاده
رقت ۲٪ به مدت ۳۰ دقیقه	جهت ضد عفونی علیه انواع باکتری، ویروس و قارچ
رقت ۲٪ به مدت ۳۰ دقیقه	مصارف عمومی
رقت ۲٪ به مدت ۲ ساعت	جهت ضد عفونی علیه انواع تخم کرم ها
رقت ۳٪ به مدت ۱ ساعت	جهت ضد عفونی علیه کریپتوسپورییدیوم
رقت ۳٪ به مدت ۴ ساعت	جهت ضد عفونی علیه اووسیست های کوکسیدیا
رقت ۳٪ به مدت ۲۴ ساعت	جهت ضد عفونی علیه تخم جرب قرمز طیور
رقت ۴٪ به مدت ۱ ساعت	جهت ضد عفونی علیه کلستریدیوم
رقت ۴٪ به مدت ۳ ساعت	جهت ضد عفونی علیه مایکوباکتریوم
رقت ۲٪ - ۳٪	حوضچه های ضد عفونی

توجه: جهت ضد عفونی سطوح بتنی و سایر سطوح صاف، حداقل ۱۰۰ میلی لیتر محلول رقیق شده یونی کوکسی کیل® به ازای هر متر مربع نیاز است.

دستورالعمل مصرف یونی کوکسی کیل®

- یونی کوکسی کیل® با دستگاه های اسپری کننده معمول، دستگاه های شست و شوی با فشار یا اسپری کننده های کوله پشتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
- قبل از مصرف باید جایگاه نگهداری حیوانات تخلیه شود.
- قبل از ضد عفونی تجهیزات و لوازم، باید با آب شست و شو داده شده باشند.
- کلیه سطوح مورد ضد عفونی باید به طور کامل با یک شوینده مناسب قبلا شسته شده باشند.
- از پاک شدن کلیه مواد شیمیایی که قبلا مورد استفاده قرار گرفته اند، اطمینان حاصل نمایید.
- محلول ۳% - ۲% یونی کوکسی کیل® جهت اسپری تهیه شود. (می توان رقیق سازی را درون مخزن اسپری انجام داد).
- قبل از اسپری ضد عفونی کننده، از خشک بودن سطوح مورد نظر اطمینان حاصل نمایید.
- پس از مصرف یونی کوکسی کیل®، کلیه ی تجهیزات و قطعات پلاستیکی (مانند ابزار های فشار قوی و شلنگ ها) را با شوینده ی قلیایی رقیق شده بشویید.

دستور العمل جهت از بین بردن کوکسیدیا، تخم کرم ها و کریپتوسپوریدیوم:

- کف و دیوار ها را حداقل تا شعاع ۲ متر ضد عفونی نمایید.
- دیوار ها و سقف های بلندتر از ۲ متر در صورت نیاز باید ضد عفونی شوند. تمام قطعات و تجهیزات داخلی را ضد عفونی نمایید.


دستور العمل جهت از بین بردن جرب، ویروس و باکتری:

- محوطه نگهداری حیوانات بطور کامل ضد عفونی شود.
- ساختمان و تجهیزات می بایست به مدت ۲ تا ۲۴ ساعت ضد عفونی شوند. (طبق جدول نحوه مصرف)
- پس از خشک شدن ساختمان، تجهیزات را در محل خود قرار داده و سپس از سالن استفاده نمایید.



تجهیزات اسپری فشار بالا:

- فشار دستگاه اسپری را روی ۲۰ تا ۷۰ بار تنظیم نمایید تا در حین اسپری بر روی دیوارها، میزان محلول مورد استفاده را کاهش دهید.
- تجهیزات اسپری کوله پشتی: از نازل اسپری با زاویه باز استفاده نمایید.

یک محلول ضد کوکسیدیز موثر، نه تنها باید قادر به از بین بردن اووسیست های کوکسیدیا باشد بلکه باید موجب توقف اسپوروله شدن اووسیست ها نیز شود.



کارآمدی محصول یونی کوکسی کیل® بر اساس توانایی آن در لیز کردن دیواره سلولی و متوقف کردن اسپوروله شدن اووسیست ها (نمودار او۲)



مطالعه دیگری نشان داد که این ترکیب با غلظت ۴٪ طی مدت ۶۰ دقیقه اووسیست ها را تقریباً به طور کامل از بین می برد؛ که این اثر بیشتر به از بین بردن اووسیست های غیر اسپوروله مربوط است. همچنین تحقیقات نشان داده است که:

- اووسیست های کوکسیدیا طی ۴ ساعت در غلظت ۳٪ یونی کوکسی کیل® کاملاً از بین می روند.
- اووسیست های کوکسیدیا طی ۳ ساعت در غلظت ۴٪ یونی کوکسی کیل® کاملاً از بین می روند.
- اووسیست های کوکسیدیا، در غلظت ۳٪ یونی کوکسی کیل®، پس از ۳ ساعت نمی توانند اسپوروله شوند.
- اووسیست های کوکسیدیا، در غلظت ۴٪ یونی کوکسی کیل®، پس از ۱ ساعت نمی توانند اسپوروله شوند.

شرایط نگهداری

- محلول در دمای اتاق و به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.
- درب ظرف بسته نگه داشته شود.

احتیاطات

- وجود فرمالدهید یا آهن (مثل زنگ) حتی به میزان بسیار کم در آب می تواند موجب کریستاله شدن و رسوب کلروکرزول شود.
- هنگام استفاده از یونی کوکسی کیل®، با پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک از پوست و چشم محافظت گردد.
- از آشامیدن این محصول و استنشاق بخارات و ذرات اسپری آن پرهیز نمایید.
- این محصول برای پوست، چشم و غشاهای مخاطی حساسیت زا می باشد. در صورت تماس، بلافاصله با آب تمیز و فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی

گالن ۵ لیتری

استفاده از یونی کوکسی کیل®

با به تاخیر انداختن مقاومت به داروهای کوکسیدیاوستات،

می تواند عمر مفید مصرف آن ها را افزایش دهد.



تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور

تولیدکننده: شرکت ویوپارس، ایران

تحت لیسانس کمپانی UNIQURE، اسپانیا

آدرس: استان البرز، شهرک صنعتی نظرآباد

تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱
www.vivapars.com

