


Unique
Solution
For All Pollution



آکوا آنتی فکت[®]
qua Antifect[®]

ضد عوامل بیماری زای ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی آبزیان
ضد عفونی کننده منحصر به فرد و سیع الطیف تخصصی مزارع تکثیر
و پرورش آبزیان (در حضور آبزی)



vivapars.com



آکوا آنتی فكت®، محصولی ایده آل برای برنامه های ایمنی زیستی در مزارع پرورشی آبزیان (سردابی، گرمابی و میگو) و کلیه سیستم های پرورش (متراکم و نیمه متراکم) می باشد. آکوا آنتی فكت®، از بین برندهای باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل های آبزیان (ماهی و میگو) می باشد.

کنترل بیماری در مزارع پرورشی، مهمترین عامل برای تولید محصولات آبزی پروری با سودآوری و کیفیت بالاست.

ترکیبات آکوا آنتی فكت®

هر لیتر از آکوا آنتی فكت® حاوی ۰۱۵ گرم گلوتارآلدئید و ۱۰۰ گرم کوکوکوات (کوکو بنزیل دی متیل آمونیوم کلراید) می باشد.

موارد مصرف آکوا آنتی فكت®

- مزارع پرورش ماهیان سردابی، گرمابی و میگو
- کلیه مراکز پرورش آبزیان جهت تجهیزات، تورها، حوضچه های ضد عفونی کننده پا، چرخ های وسایل نقلیه، ضد عفونی استخراجها

پاتوژن هایی که آکوا آنتی فكت® در پرورش ماهی قادر به کنترل آنهاست:



• بیماری های باکتریایی:

- فرونکلوزیس (Aeromonas salmonicida)
- یرسینیوز یا بیماری دهان قرمز (Yersinia ruckeri)
- بیماری ویریوز (Vibrio salmonicida)
- Carnobacterium piscicola
- Pseudomonas fluorescens
- Streptococcus imillleri- Streptococcus difficile- Streptococcus iniae
- Lactococcus piscium- Lactococcus garvieae

- نکروز عفونی پانکراس (IPN)
- سپتی سمی هموراژیک ویروسی (VHS)
- نکروز عفونی بافت خونساز (IHN)

پاتوژن هایی که آکوا آنتی فكت® در پرورش میگو قادر به کنترل آنهاست:



• بیماری های ویروسی:

- سندروم لکه سفید (White spot syndrome)
- بیماری کله زرد (Yellow-headed virus)
- سندروم تارا (Taura syndrome)

• بیماری های انگلی:

- ویریوز: ناشی از باکتری گونه ی ویریو (گرم منفی، متحرک، باکتری بی هوازی از خانواده Vibrionaceae) عامل بیماری EMS (سندروم مرگ زودرس ناشی از سویه باکتری ویریو پاراهمولیتیکوس) می باشد که در میگوی ببری و میگوی پاسفید رایج است.
- آلودگی آتروموناس هیدروفیلا، باکتری گرم منفی از خانواده Aeromonadaceae که باعث مسمومیت غذایی در مصرف کنندگان میگوی آلوده به این باکتری می شود.
- آلودگی ناشی از سودوموناس، باکتری گرم منفی از خانواده Edwardsiella ictalurid از Pseudomonadaceae باعث مسمومیت غذایی است. بیماری ناشی از Enterobacteriaceae می باشد.

- Zoothamnium SP.
- (تک یاخته مژه دار) با تشکیل کلنی در آبشش میگو، می تواند باعث مرگ آن شود.

مزایای آکوا آنتی فکت®:

- دارای قابلیت تجزیه پذیری زیستی
- مؤثر علیه باکتری، ویروس، انگل و قارچ
- قابل استفاده در مزارع پرورش میگو و ماهی
- قابل استفاده در حضور آبزیان
- فعال در حضور مواد آلی
- قادر اثرات خورندگی

در کلیه موارد استفاده، آکوا آنتی فکت® باید قبل از استفاده در آب رقیق شود و در نزدیکی هواوهدها به استخر اضافه شود. دو هفته قبل از برداشت ماهی و میگو مصرف آکوا آنتی فکت® قطع شود.

جدول ۱. دُز مصرف آکوا آنتی فکت® در آبزیان

توضیحات	دوز مصرفی آکوا آنتی فکت	مزارع پرورش
بسته به میزان آلودگی و وضعیت آب تا ۱ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخراج تحت نظر دامپزشک قابل استفاده می باشد. (ضد عفونی راه راه ۱۴ روز تکرار نمایید.)	۵-۸ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخراج	ماهیان سردآبی 
بسته به میزان آلودگی و وضعیت آب می توان تا ۲/۵ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخراج تحت نظر دامپزشک قابل استفاده نمود. (ضد عفونی راه راه ۱۴ روز تکرار نمایید.)	۱-۵ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخراج	میگو 
بسته به میزان آلودگی و وضعیت آب می توان تا ۵/۲ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخراج تحت نظر دامپزشک قابل استفاده نمود. (ضد عفونی راه راه ۱۴ روز تکرار نمایید.)	۱-۵/۰ لیتر به ازای ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخراج	ماهیان گرمابی 
در صورت احتمال آلودگی مجدد، ۱۴ روز بعد درمان را تکرار نمایید.	۱-۱/۲۵ لیتر از محصول رادر ۱۰۰۰ متر مکعب آب استخراج حل نمایید.	کاهش آلودگی با Zoothamnium

ابتدا استخر را تخلیه، پس از خشک شدن استخر، قبل از آهک پاشی، آکوا آنتی فکت® را با رقت ۱ به ۱۰ تا ۱ به ۱۰۰ (بسته به میزان آلودگی) بر کلیه سطوح استخراج اسپری نمایید.

جدول ۲. دُز مصرفی آکوا آنتی فکت® جهت ضد عفونی وسایل و تجهیزات

جمع آوری و ضد عفونی کردن تمامی وسایل و تجهیزات در کلیه مراحل تولید، بسیار پر اهمیت بوده و منجر به کاهش خطر انتشار عوامل عفونی می گردد.

توضیحات	میزان رقت	محل مورد نظر
۱ لیتر آکوا آنتی فکت® رقیق شده به ازای هر ۵۰۰ متر مربع، قبل از آهک پاشی و پخش کود در کف استخراج اسپری شود.	۱:۱۰۰	ضد عفونی جهت ریشه کنی بیماری در حین آماده سازی استخراج
۳۰۰ میلی لیتر آکوا آنتی فکت® رقیق شده به ازای هر متر مربع اسپری شود.	۱:۱۵۰	ضد عفونی کف و دیوار
به مدت ۲۰ دقیقه تجهیزات و تور در محلول غوطه ور شود. سپس با آب تمیز شسته شود.	۱:۱۰۰	ضد عفونی تور و تجهیزات
بارقت مورد نظر مصرف شده و هر ۳ روز یک بار تعویض گردد.	۱:۱۰۰	حوضچه ضد عفونی چرخ خودرو و حوضچه ضد عفونی پا
بارقت مورد نظر ضد عفونی و آبکشی شود.	۱:۱۵۰	تراف، سینی، تور ساجوک و لوازم مربوط به پرورش
وسایل نقلیه به طور کامل ضد عفونی گردد.	۱:۱۵۰	ضد عفونی وسایل نقلیه

منع مصرف

• ندارد

شرایط نگهداری

- محصول در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب گالن پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود.
- پس از باز شدن درب گالن، محصول حداقل تا ۶ روز مصرف گردد.
- محلول رقیق شده حداقل تا ۴۸ ساعت قابل استفاده می باشد.

بسته بندی

گالن ۵ لیتری



تولید کننده: شرکت ویوا پارس
تحت لیسانس شرکت یونیکیور اسپانیا



@vivapars
۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱