




تیامفنیکور<sup>®</sup> ۲۵%

# Thiamphenicure<sup>®</sup> 25%

آنتی بیوتیک وسیع الطیف نسل جدیدی از خانواده آمفنیکل ها

ORAL  
SOLUTION  
ANTIBIOTIC





## تیامفنیکور® ۲۵%

آنتی بیوتیک وسیع الطیف نسل جدیدی  
از خانواده آمفنیکل ها

ترکیبات | هر یک لیتر از محصول حاوی: تیامفنیکل ۲۵۰ گرم

### موارد مصرف


• **نیمچه های گوشتی:** درمان بیماری های باکتریایی مجاری تنفسی و گوارشی، بیماری مزمن تنفسی، کلی باسیلوز، کوریزای عفونی، درمان بیماری های عفونی با عامل انواع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، ریکتزیا، کلامیدیا، انواع سویه های مایکوپلاسما، سویه های پاستورلا، سویه های استافیلوکوک، سویه های سالمونلا، اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال و کلستریدیوم پرفرنژنس.



• **بوقلمون:** درمان بیماری های عفونی با عوامل: سویه های سالمونلا، پاستورلا مولتی سیدا، اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال، استافیلوکوکوس اورئوس، کلستریدیوم پرفرنژنس، مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، مایکوپلاسما سینوویه، مایکوپلاسما مله آگریدیس.



### مکانیسم اثر تیامفنیکور® ۲۵%



تیامفنیکل، آنتی بیوتیکی سنتتیک و باکتریواستاتیک محسوب می شود. این آنتی بیوتیک جذب سلول های باکتریایی می شود و با اتصال به تحت واحد 50-S ریبوزوم های 70-S و اختلال در فعالیت پپتیدیل ترانسفراز، سنتز پروتئین میکروبی را مهار می کند. از آنجا که تشکیل پیوند پپتیدی مهار می شود، پس سنتز پروتئین در ریبوزوم های پروکاریوتی و یوکاریوتی (میتوکندری) مهار شده و در نتیجه رشد باکتری متوقف می گردد.

## مزایای تیامفنیکیور® ۲۵%

- عدم ایجاد کم خونی آپلاستیک
- دارای تاییدیه مصرف در طیور از اتحادیه ی اروپا (EMA)
- عملکرد مناسب علیه باکتری های مقاوم به سایر آنتی بیوتیک های گروه آمفنیکل
- وسیع الطیف، مؤثر علیه باکتری های هوازی، بی هوازی، گرم مثبت و گرم منفی
- قابل ارزیابی بودن غلظت سرمی تیامفنیکل تا ۲۴ ساعت پس از مصرف خوراکی در نیمچه های گوشتی
- جذب خوراکی سریع

## مقدار و روش مصرف

روزانه ۲ - ۱/۶ میلی لیتر محلول تیامفنیکیور® ۲۵% به ازای ۱۰ کیلوگرم وزن زنده ی بدن (معادل ۵۰ - ۴۰ میلی گرم تیامفنیکل به ازای هر کیلوگرم وزن زنده ی بدن) به مدت ۵ - ۳ روز متوالی به روش خوراکی به همراه آب آشامیدنی.

**نکته مهم:** غلظت محلول آماده شده نباید از ۸۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی کمتر و از ۱۲۵۰ میلی لیتر بیشتر باشد.

⚠ این محصول نیازی به رقیق سازی اولیه در مقدار کم آب ندارد. جهت جلوگیری از رسوب دارو در آب آشامیدنی، مقدار محاسبه شده از تیامفنیکیور® ۲۵% را مستقیماً به مخزن آب آشامیدنی اضافه نمایید.

مقدار و طول مدت مصرف تحت نظر دامپزشک صورت گیرد.

## منع مصرف

- در حیوانات با آسیب ها و مشکلات کلیوی مصرف نشود.
- در طیور تخم گذار که تخم آن ها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

## دوره پرهیز از مصرف

- نیمچه گوشتی: ۴ روز
- بوقلمون: ۶ روز

## تداخل دارویی

از مصرف همزمان آنتی بیوتیک تیامفنیکل با آنتی بیوتیک های خانواده پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و آمینو گلیکوزید ها پرهیز نمایید.

## شرایط نگهداری

- محصول در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب بطری پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود.

## احتیاطات

- فقط برای مصرف دامپزشکی
- تحت نظر دامپزشک مصرف شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- در صورت انقضای محصول، مصرف نشود.
- عمر قفسه ای محصول در صورتی که در بسته بندی اصلی باشد، ۲ سال و در صورت باز شدن درب محصول ۲۸ روز می باشد.

## بسته بندی

بطری یک لیتری



# Thiamphenicure® 25%



تولید کننده: شرکت ویوا پارس

@vivapars  
۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱