



Newcastle Disease and Avian Influenza (H9 subtype) Vaccine, Inactivated (A-VII strain + WJ57 strain)

واکسن کشته دوگانه بیماری نیوکاسل و آنفلوآنزای پرندگان (تحت تیپ H9)

ترکیبات

(۱) امولسیون شیری رنگ

(۲) حاوی ویروس بازآرایی شده سویه ژنوتیپ VII بیماری نیوکاسل و

ویروس غیر فعال آنفلوآنزای پرندگان (تحت تیپ H9) با **قرابت ۹۰**

درصدی با سویه در گردش ایران

(۳) تیترو ویروس نیوکاسل و ویروس آنفلوآنزای پرندگان (تحت تیپ H9)

قبل از غیر فعال سازی: در هر ۰.۱ میلی لیتر حداقل $10^{8.5}$ EID₅₀



QYH Biotech اولین و بزرگترین

تولیدکننده واکسن های طیوری در چین با بیش از ۵۰ سال سابقه

موارد مصرف

این محصول برای ایمن سازی علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوانزای پرندگان (تحت تیپ H9) در طیور استفاده می شود. مشابهت بسیار زیاد ویروس نیوکاسل بازآرایی شده در واکسن با سویه های در حال گردش در ایران (ژنوتیپ VII) و نیز قرابت ۹۰ درصدی سویه H9N2 بکار رفته با سویه های در حال گردش در کشور از امتیازات مهم و منحصر به فرد این واکسن غیر فعال است.

دز و نحوه مصرف

- برای طیور گوشتی و مرغان مادر و تخمگذار، با سنین کمتر از ۳ هفته، ۰.۲ میلی لیتر به ازای هر پرنده به صورت تزریق داخل عضلانی و یا زیر جلدی
- برای طیور گوشتی و مرغان مادر و تخمگذار، با سنین بیشتر از ۳ هفته، ۰.۵ میلی لیتر به ازای هر پرنده به صورت تزریق داخل عضلانی و یا زیر جلدی
- دوره ایمنی زایی واکسن ۶ ماه می باشد.

عوارض جانبی

ندارد

توجه

- فقط در گله های سالم و تحت نظر دکتر دامپزشک تجویز شود.
- در صورت مشاهده هر گونه تغییر رنگ، چند فاز شدن، شکستگی بطری یا وجود اجسام خارجی در محصول از مصرف آن خودداری شود.
- محصول را قبل از مصرف به دمای اتاق رسانده و به خوبی تکان دهید.
- پس از باز شدن درب محصول، حداکثر در طول یک روز مصرف شود.
- ویال ها، ابزار واکسیناسیون و بقایای واکسن ها باید به طور کامل استریل و یا ضد عفونی شوند.
- از انجماد و یا افزایش بیش از حد دمای محصول جلوگیری شود.

بسته بندی

بطری ۵۰۰ میلی لیتری
HDPE

عمر قفسه ای

۲۴ ماه

شرایط نگهداری

در دمای ۲ تا ۸ درجه
سانتی گراد نگهداری شود.