



واکسن زنده بیماری گامبورو (سویه B87)

ترکیبات و مواد

این واکسن حاوی سویه اینترمدیت B87 ویروس بیماری گامبورو، تکثیر شده در تخم مرغ جنین دار SPF می باشد. تیترو ویروس در هر دز حداقل 10^3 EID₅₀ می باشد.

مشخصات

واکسن لیوفیلیزه که پس از افزودن حلال به سرعت حل می شود.

مورد استفاده

این محصول برای ایمنی زایی علیه بیماری گامبورو در طیور استفاده می شود.

تجویز زیر نظر دکتر دامپزشک صورت پذیرد.

این محصول می تواند برای جوجه تمام گونه های طیور، با توجه به سطح آنتی بادی مادری گله زیر نظر دامپزشک استفاده شود.

با توجه به مقدار دز درج شده روی لیبل با روش قطره چشمی یا آب آشامیدنی تجویز گردد.

• قطره چشمی

برای رقیق سازی هر ۱۰۰۰ دز از واکسن لیوفیلیزه در ۳۰ میلی لیتر آب مقطر استریل کاملاً حل شده سپس با استفاده از یک قطره چکان استاندارد یک قطره در چشم هر پرنده چکانده شود. این روش بهترین شیوه برای اطمینان از واکسیناسیون انفرادی بوده و بر دیگر روش ها برتری دارد.

• آب آشامیدنی

واکسن در آب آشامیدنی حل شود. میزان رقت به سن پرنده بستگی دارد. به این صورت که ۱۰۰۰ دز از واکسن برای واکسیناسیون پرندگان تا ۱۰ روزگی بایستی در ۱۰ لیتر آب خنک، تمیز و عاری از کلر یا دیگر مواد شیمیایی ضد عفونی کننده کاملاً حل شود. به ازای هر یک روز سن اضافی برای ۱۰۰۰ پرنده یک لیتر آب اضافی در نظر گرفته شود. بهتر است هنگام رقیق سازی واکسن از محافظت کننده های واکسن در آب آشامیدنی استفاده شود.

توجه

- فقط برای گله های سالم تجویز شود.
- در روش تجویز به صورت آشامیدنی از تانکر های فلزی استفاده ننمایید. آب مورد مصرف باید تمیز و عاری از کلر و هر گونه ضد عفونی کننده باشد.
- ۲ تا ۴ ساعت قبل از تجویز به روش آشامیدنی، با توجه به فصل، وضعیت گله، وضعیت منطقه و شرایط دیگر بسته به نظر دکتر دامپزشک به گله تشنگی داده شود. آبخوری باید در جای خنک و دور از نور مستقیم آفتاب قرار داده شود. تمامی آب حاوی واکسن باید حداکثر تا ۱ ساعت مصرف شود.
- ویال های خالی، ابزار واکسیناسیون و بقایای واکسن ها باید به طور کامل استریل و با ضد عفونی شوند.

شرایط نگهداری

در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
عمر قفسه ای محصول ۲۴ ماه می باشد.

بسته بندی

ویال های ۲۰۰۰ دزی
هر جعبه حاوی ۱۰ ویال می باشد.

