



Felishot® PHC

هر ویال واکسن حاوی:

۱. ویروس پن لوکوپنی گربه سانان
۲. هرپس ویروس گربه سانان
۳. کلسی ویروس گربه سانان

واکسن کشته
سه گانه گربه



Canishot® DHPPL | واکسن شش گانه سگ

(واکسن زنده چهارگانه + واکسن کشته دوگانه)

واکسن کشته دوگانه حاوی:

۱. لپتوسپیرا کانیکولا
۲. لپتوسپیرا ایکتره موراژی

واکسن زنده چهارگانه حاوی:

۱. ویروس دیستمپر سگ سانان
۲. آدنووایروس تیپ ۲ سگ سانان
۳. پاروویروس سگ سانان
۴. ویروس پارا آنفلوانزا سگ سانان



Canishot® RV-K

واکسن کشته
بیماری هاری





واکسن کشته سه گانه گربه

Felishot® PHC



ویژگی‌ها



- واکسن ضروری توصیه شده توسط انجمن جهانی دامپزشکی دام‌های کوچک (WSAVA)
- ایجاد سطح بالایی از آنتی‌بادی
- فاقد عوارض جانبی
- درد کمتر در هنگام تزریق

کاربرد



جهت کنترل و پیشگیری از بیماری پن‌لوکوپنی، رینوتراکئیت عفونی و عفونت کلسی ویروسی در گربه‌سانان

ترکیبات در هر دوز



واکسن FeliShot® PHC (سوسپانسیون همگن صورتی رنگ)

- ویروس پن‌لوکوپنی گربه‌سانان $10^{4.8} \text{TCID}_{50} \leq$
- هرپس ویروس گربه‌سانان $10^{6.2} \text{TCID}_{50} \leq$
- کلسی ویروس گربه‌سانان $10^{6.2} \text{TCID}_{50} \leq$

روش مصرف و برنامه واکسیناسیون



نوع واکسن	واکسن نوبت اول	واکسن نوبت دوم	واکسن یادآور	مقدار و محل تزریق
Felishot® PHC	حداقل در سن ۸ هفته‌گی	۳ تا ۴ هفته پس از واکسیناسیون نوبت اول	۱ سال پس از واکسیناسیون نوبت دوم و تکرار سالانه	۱ میلی‌لیتر از واکسن به صورت زیرجلدی یا به صورت داخل عضلانی تزریق شود. محل تزریق پیشنهادی برای تزریق زیرجلدی در پوست قسمت پایین اندام‌های حرکتی و انتهای دم است.

ایمنی‌زایی



این واکسن قادر به ایجاد ایمنی برای مدت ۱۲ ماه (یک سال) می‌باشد.



Felishot® PHC

احتیاطات قبل از مصرف



۱. در حیواناتی که قبلاً واکسینه شده و به واکسن واکنش یا شوک نشان داده‌اند، مصرف نشود.
۲. از واکسن فقط در گربه استفاده شود.
۳. در حیوانات مبتلا به تب، سوء تغذیه، بیماری‌های عفونی، انگلی و سرکوب کننده سیستم ایمنی یا حیوانات تحت استرس زیاد و باردار یا شیرده مصرف نشود.
۴. واکسیناسیون پس از اتمام شرایط استرس‌زا مانند تغییرات محیطی، تغییر خوراک و تحرک شدید انجام شود و حداقل یک هفته قبل و بعد از ایجاد استرس در حیوانات خودداری شود.

احتیاطات حین مصرف



۱. قبل از استفاده جهت یکنواختی محصول، ویال حاوی واکسن به خوبی تکان داده شود.
۲. واکسن قبل از تجویز و در حین تجویز در دمای حدود ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
۳. از سرنگ‌ها و سوزن‌های استریل استفاده کرده و قانون «۱ حیوان، ۱ سوزن» رعایت شود.
۴. قبل از واکسیناسیون محل تزریق با الکل ۷۰ درصد استریل شود؛ محل تزریق آلوده ممکن است باعث ایجاد التهاب یا عفونت شود.
۵. در صورت مشاهده هر گونه ظاهر و محتوای غیر طبیعی مانند تغییر رنگ از مصرف واکسن پرهیز شود.

احتیاطات بعد از مصرف



۱. در صورت بروز هرگونه واکنش‌های پس از واکسیناسیون مانند از دست دادن اشتها، کاهش انرژی، بثورات پوستی، استفراغ و تشنج به دامپزشک مراجعه گردد.
۲. در موارد بروز واکنش‌های آلرژیک پس از واکسیناسیون، درمان دارویی متناسب با استفاده از آدرنالین، کورتیکواستروئیدها و یا سایر درمان‌های ضد آلرژیک می‌بایست تحت نظارت دامپزشک صورت گیرد.

شرایط نگهداری و عمر قفسه‌ای



- واکسن دور از نور مستقیم خورشید، گرما، یخ زدگی و در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
- شرایط نگهداری نامناسب بر ایمنی‌زایی و اثربخشی واکسن اثرات منفی خواهد داشت.
- عمر قفسه‌ای: ۲۴ ماه پس از تاریخ تولید.

بسته‌بندی



ویال تک دوز

واردکننده و توزیع کننده



شرکت سوین فارمد دارو





واکسن ترکیبی شش گانه سگ (واکسن زنده چهارگانه + واکسن کشته دوگانه)

Canishot® DHPPL



ویژگی‌ها



- ایجاد محافظت کامل علیه شش عامل بیماری‌زای اصلی در سگ‌سانان
- فاقد عوارض جانبی
- درد کمتر در زمان تزریق
- بدون نیاز به حلال جداگانه

کاربرد



جهت کنترل و پیشگیری از بیماری دیستمپر، هپاتیت عفونی، عفونت‌های پاروویروسی، تراکتوبرونشیت عفونی و لپتوسپیروز سگ‌سانان.

ترکیبات در هر دوز واکسن CaniShot® DHPPL



ویال اول: واکسن زنده CaniShot® DHPPL (پودر لیوفیلیزه سفید تا زرد رنگ)

ویروس دیستمپر سگ‌سانان (سویه Onderstepoort) $10^{3.5} \text{TCID}_{50} \leq$
 آدنو ویروس تیپ ۲ سگ‌سانان (سویه Manhattan) $10^{3.0} \text{TCID}_{50} \leq$
 پاروویروس سگ‌سانان (سویه LP-۷۸۰۹۱۶) $10^{5.0} \text{TCID}_{50} \leq$
 ویروس پاراآنفلوانزا سگ‌سانان (سویه D۰۰۸) $10^{4.0} \text{TCID}_{50} \leq$

ویال دوم: واکسن کشته CaniShot® Lepto (محلول قرمز رنگ)

لپتوسپیرو کانیکولا $5 \times 10^{7.0} \text{units/ml} \leq$
 لپتوسپیرو ایکترهموراژی $5 \times 10^{7.0} \text{units/ml} \leq$



Canishot® DHPPL

روش مصرف و برنامه واکسیناسیون



نوع واکسن	واکسن نوبت اول	واکسن نوبت دوم	واکسن یادآور	مقدار و محل تزریق
Canishot® DHPPL	حداقل در سن ۶ هفتگی	۳ تا ۴ هفته پس از واکسیناسیون نوبت اول	۱ سال پس از واکسیناسیون نوبت دوم و تکرار سالیانه	یک ویال حاوی محلول واکسن Canishot® Lepto به یک ویال حاوی پودر واکسن Canishot® DHPPL اضافه و به خوبی مخلوط شود و پس از به دست آمدن محلولی یکنواخت، ۱ میلی‌لیتر از واکسن ترکیب شده به صورت زیرجلدی در پوست پشت گردن یا به صورت داخل عضلانی تزریق شود.

ایمنی‌زایی



این واکسن قادر به ایجاد ایمنی برای مدت ۱۲ ماه (یک سال) می‌باشد.

احتیاطات قبل از مصرف



۱. در حیواناتی که قبلاً واکسینه شده و به واکسن واکنش یا شوک نشان داده‌اند، مصرف نشود.
۲. از واکسن فقط در سگ استفاده شود.
۳. در حیوانات مبتلا به تب، سوء تغذیه، بیماری‌های عفونی، انگلی و سرکوب کننده سیستم ایمنی یا حیوانات تحت استرس زیاد و باردار یا شیرده مصرف نشود.
۴. واکسیناسیون پس از اتمام شرایط استرس‌زا مانند تغییرات محیطی، تغییر خوراک و تحرک شدید انجام شود و حداقل یک هفته قبل و بعد از ایجاد استرس در حیوانات خودداری شود.

احتیاطات حین مصرف



۱. قبل از استفاده جهت یکنواختی محصول، ویال حاوی واکسن به خوبی تکان داده شود.
۲. واکسن قبل از تجویز و در حین تجویز در دمای حدود ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
۳. از سرنگ‌ها و سوزن‌های استریل استفاده کرده و قانون «۱ حیوان، ۱ سوزن» رعایت شود.
۴. قبل از واکسیناسیون محل تزریق با الکل ۷۰ درصد استریل شود و پس از خشک شدن، تزریق انجام شود.
۵. در صورت مشاهده هر گونه ظاهر و محتوای غیر طبیعی مانند تغییر رنگ از مصرف واکسن پرهیز شود.



Canishot® DHPPL

احتیاطات بعد از مصرف



۱. در صورت بروز هرگونه واکنش‌های پس از واکسیناسیون مانند از دست دادن اشتها، کاهش انرژی، بثورات پوستی، استفراغ و تشنج به دامپزشک مراجعه گردد.
۲. در موارد بروز واکنش‌های آلرژیک پس از واکسیناسیون، درمان دارویی متناسب با استفاده از آدرنالین، کورتیکواستروئیدها و یا سایر درمان‌های ضد آلرژیک می‌بایست تحت نظارت دامپزشک صورت گیرد.

شرایط نگهداری و عمر قفسه‌ای



- واکسن دور از نور مستقیم خورشید، گرما، یخ زدگی و در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
- شرایط نگهداری نامناسب بر ایمنی‌زایی و اثربخشی واکسن اثرات منفی خواهد داشت.
- عمر قفسه‌ای: ۲۴ ماه پس از تاریخ تولید.

بسته‌بندی



۱. یک دوز CaniShot® DHPPL

۲. یک دوز CaniShot® Lepto

واردکننده و توزیع کننده



شرکت سوین فارمد دارو



واکسن کشته بیماری هاری جهت کنترل و پیشگیری از بروز بیماری هاری با ایجاد ایمنی فعال در سگ، گربه و گاو



Canishot® RV-K

ویژگی‌ها



- استفاده شده از سویه پاستور با ایمنی بالا
- دارای محافظت متقاطع در برابر تمام سویه های ویروس هاری کشف شده تاکنون
- بدون عوارض جانبی

کاربرد



جهت کنترل و پیشگیری از بروز عفونت ناشی از ویروس هاری در سگ‌ها، گربه‌ها و گاو‌ها.

ترکیبات در هر دوز



واکسن CaniShot®RV-K (سوسپانسیون همگن صورتی رنگ)

ویروس هاری (سویه پاستور) $10^{7.0} \text{FAID}_{50}$

روش مصرف و برنامه واکسیناسیون



نوع واکسن	واکسن نوبت اول	واکسن نوبت دوم	واکسن یادآور	مقدار و محل تزریق
Canishot® RV-K	حداقل در سنین ۳ تا ۴ ماهگی (سگ، گربه و گاو) در صورتی که واکسیناسیون زیر ۳ ماهگی زده شود، زدن یک واکسیناسیون یادآور در ۳ ماهگی توصیه می‌گردد.	۴ هفته بعد از اولین واکسیناسیون در صورتی که اولین واکسن در ۳ ماهگی زده شده باشد.	تکرار سالیانه	۱ میلی‌لیتر از واکسن به صورت زیرجلدی در پوست پشت گردن یا به صورت داخل عضلانی تزریق شود.

نکته: در صورت گزش حیوان توسط حیوانات بی‌سرپرست و واکسینه نشده، تزریق واکسن هاری باید در اولین فرصت انجام شود.

ایمنی‌زایی



این واکسن قادر به ایجاد ایمنی برای مدت ۱۲ ماه (یک سال) می‌باشد.



Canishot® RV-K

احتیاطات قبل از مصرف



۱. در حیواناتی که قبلاً واکسینه شده و به واکسن واکنش یا شوک نشان داده‌اند، مصرف نشود.
۲. از واکسن فقط در حیوانات هدف (سگ، گربه و گاو سالم) استفاده شود.
۳. در حیوانات مبتلا به تب، سوء تغذیه، بیماری‌های عفونی، انگلی و سرکوب کننده سیستم ایمنی یا حیوانات تحت استرس زیاد و باردار یا شیرده مصرف نشود.
۴. واکسیناسیون پس از اتمام شرایط استرس‌زا مانند تغییرات محیطی، تغییر خوراک و تحرک شدید انجام شود و حداقل یک هفته قبل و بعد از ایجاد استرس در حیوانات خودداری شود.

احتیاطات حین مصرف



۱. قبل از استفاده جهت یکنواختی محصول، ویال حاوی واکسن به خوبی تکان داده شود.
۲. واکسن قبل از تجویز و در حین تجویز در دمای حدود ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
۳. از سرنگ‌ها و سوزن‌های استریل استفاده کرده و قانون «۱ حیوان، ۱ سوزن» رعایت شود.
۴. قبل از واکسیناسیون محل تزریق با الکل ۷۰ درصد استریل شود؛ محل تزریق آلوده ممکن است باعث ایجاد التهاب یا عفونت شود.
۵. در صورت مشاهده هر گونه ظاهر و محتوای غیر طبیعی مانند تغییر رنگ از مصرف واکسن پرهیز شود.

احتیاطات بعد از مصرف



۱. در صورت بروز هرگونه واکنش‌های پس از واکسیناسیون مانند از دست دادن اشتها، کاهش انرژی، بثورات پوستی، استفراغ و تشنج به دامپزشک مراجعه گردد.
۲. در موارد بروز واکنش‌های آلرژیک پس از واکسیناسیون، درمان دارویی متناسب با استفاده از آدرنالین، کورتیکواستروئیدها و یا سایر درمان‌های ضد آلرژیک می‌بایست تحت نظارت دامپزشک صورت گیرد.
۳. در صورت تزریق بیش از حد واکسن (overdose) در آزمایش‌های صورت گرفته با افزایش دوز به میزان دو برابر در حیوانات هدف هیچگونه واکنش ناخواسته‌ای مشاهده نشده است.

شرایط نگهداری و عمر قفسه‌ای



- واکسن دور از نور مستقیم خورشید، گرما، یخ زدگی و در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.
- شرایط نگهداری نامناسب بر ایمنی‌زایی و اثربخشی واکسن اثرات منفی خواهد داشت.
- عمر قفسه‌ای: ۲۴ ماه پس از تاریخ تولید.

بسته‌بندی



ویال تک دوز

واردکننده و توزیع کننده



شرکت سویین فارمد دارو

