

UltraX®

اولتراکس مایع
ضد ویروس، ضد باکتری
و ضد قارچ



- پیشگیری و کمک به درمان بیماری های تنفسی و ویروسی، باکتریایی و قارچی گله های طیور
- کنترل واکنش های پس از واکسیناسیون
- محرک رشد
- کمک به درمان آنتریت نکروتیک، مایکوپلاسموز، کلی باسیلوز و اسهال باکتریایی
- پیشگیری و کمک به درمان سالمونلوز

UNIQCURE
ADDITIVES
& PHARMA

استفاده به صورت اسپری در حضور گله

موارد مصرف	دوز توصیه شده (میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب)	توضیحات
کنترل واکنش های پس از واکسیناسیون	۱۰۰	۱۲ ساعت پس از واکسیناسیون با واکسن زنده به مدت حداقل ۳ روز متوالی ۲ بار در روز استفاده شود.
کمک به درمان بیماری های تنفسی، ویروسی و باکتریایی	۱۰۰	۲ الی ۴ بار در روز. به مدت حداقل ۴ الی ۵ روز استفاده از اولتراکس® به روش اسپری بایستی در شرایط خاموش بودن هیترها و هواکش های سالن و با قطرات مناسب از فاصله ۳۰ سانتی متری سر پرند و در تمام سالن صورت گیرد.
درمان کمکی در گله های مشکوک به MG/MS	۱۰۰	علاوه بر استفاده از داروهای ضد مایکوپلاسمایی (تیلوالوزین، انروفلوکساسین و نورفلوکساسین) اولتراکس® را به مدت ۳ تا ۵ روز اسپری نمایید.

اولتراکس® ۲۴ ساعت قبل و تا ۱۲ ساعت بعد از واکسیناسیون نباید مصرف شود.

استفاده در آب آشامیدنی

موارد مصرف	دوز توصیه شده (میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب)	توضیحات
ورود جوجه ها به گله	۱۰	تجویز اولتراکس® به تنهایی و یا همراه با آنتی بیوتیک ها در ۳ تا ۵ روز اول زندگی در موارد وجود سابقه بیماری با دز ۲۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب توصیه میشود.
کنترل و پیشگیری واکنش های پس از واکسیناسیون	۱۰	۱۲ ساعت پس از واکسیناسیون با واکسن های زنده تنفسی همچون نیوکاسل و برونشیت به مدت حداقل ۳ روز متوالی مصرف شود. اولتراکس® نباید ۲۴ ساعت قبل و تا ۱۲ ساعت بعد از واکسیناسیون استفاده شود.
درمان کمکی بیماری های تنفسی	۲۰	مدت ۵-۴ روز متوالی به همراه آنتی بیوتیک
کنترل اسهال غیر اختصاصی	۲۰-۳۰	دز موثر در مرغ مادر، اجداد و گوشتی: ۳۰-۲۰ میلی لیتر/۱۰۰ لیتر دز موثر در مرغ تخمگذار: ۳۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر
درمان کمکی کلی باسیلوز	۳۰	حداقل به مدت ۳ تا ۷ روز
محرک رشد	۱۰	جایگزین محرک های رشد آنتی بیوتیکی نظیر آویلامایسین و فلاوومایسین
عفونت بند ناف	۸۰	به مدت ۳ تا ۵ روز در جوجه یک روزه
پیشگیری از سالمونلوز	۱۰-۲۰	دز پیشگیری: ۱۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب به صورت مداوم دز در گله مبتلا: ۲۰ میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب به مدت حداقل ۲۱ روز
کمک به درمان آنتریت نگروتیک	۲۰	به مدت ۳ تا ۷ روز
کمک به درمان گله های مشکوک به MG/MS	۱۰۰	همزمان با روش اسپری اولتراکس® را به مدت ۳ الی ۵ روز روزانه ۲ نوبت ۸ ساعته همراه با داروهای ضد مایکوپلاسمایی (تیلوالوزین، انروفلوکساسین، نورفلوکساسین و...) در آب آشامیدنی استفاده نمایید.

موارد و میزان مصرف جهت ضد عفونی سطوح تخم مرغ نطفه دار

به منظور کاهش آلودگی و نیز افزایش ماندگاری، تخم مرغ ها را پس از جمع آوری در محلول اولتراکس® غوطه ور سازید و یا اولتراکس® را روی آن ها اسپری نمایید.

موارد مصرف	دوز توصیه شده (میلی لیتر به ازای هر ۱۰۰ لیتر آب)
ضد عفونی تخم مرغ نطفه دار	۶۰
ضد عفونی تخم مرغ نطفه دار کثیف (شسته شده)	۱۰۰
ضد عفونی سترها (کف، دیواره، سقف و کانال ها)	۴۰
ضد عفونی سینی ها و سایر تجهیزات هچری	۴۰
ضد عفونی عمومی ساختمان (دیواره، کف، سقف، سالن و تجهیزات)	۲۰
ضد عفونی هچری ها (جهت پیشگیری از آسپرزیلوس)	۸۰-۱۰۰
استفاده در رطوبت سازه‌های موجود در اتاق خنک کننده	۲۰
اسپری از طریق نازل ها جهت کنترل آلودگی باکتریایی و قارچی (در ستر و هچر)	۸۰-۱۰۰

استفاده از اولتراکس® در جوجه کشی، در کاهش آلودگی های باکتریایی و قارچی بسیار موثر است.

اولتراکس® اسیدیفایر نیست.

اگر چه اولتراکس® حاوی اسیدهای ارگانیک مختلفی است، اما اسیدیفایر نیست و برخلاف اسیدیفایرها، مکانیسم اثر اولتراکس® وابسته به pH یا ترکیبات خوراک نیست.



UltraX®

موارد مصرف

قابل استفاده به روش اسپری جهت:

- پیشگیری و کمک به درمان بیماری های تنفسی طیور (برونشیت عفونی، آنفلوانزا و نیوکاسل)
- کنترل واکنش های پس از واکسیناسیون

قابل استفاده در آب آشامیدنی جهت:

- پیشگیری و کمک به درمان بیماری های تنفسی (ویروسی، قارچی و باکتریایی) همزمان با روش اسپری
- کنترل واکنش های پس از واکسیناسیون همزمان با روش اسپری
- پیشگیری و کمک به درمان سالمونلوز
- کمک به درمان آنتریت نکروتیک، مایکوپلاسموز، کلی باسیلوز و سایر عفونت های باکتریایی
- محرک رشد طبیعی (فاقد آنتی بیوتیک)

سایر مضارفات شامل:

- ضد عفونی تخم مرغ و هچری
- کمک به رفع جراحات سم (گاو)

آنچه اولتراکس را منحصر بفرد می سازد:

- طبقه بندی در گروه مواد کاملاً بی خطر (GRAS)
- سازگار با سایر داروها و افزودنی ها
- عدم ایجاد مقاومت باکتریایی
- فاقد دوره پرهیز از مصرف حتی در زمان استفاده در آب آشامیدنی



*You've got needs
we've got UltraX!*



تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور

تولیدکننده: شرکت ویواپارس، ایران

تحت لیسانس کمپانی UNIQCURE، اسپانیا

آدرس: استان البرز، شهرک صنعتی نظرآباد



تلفن: ۰۲۱- ۶۶ ۱۳۱ ۱۳۱

www.vivapars.com