



یونی کوکسی کیل®

UnicocciKill

ضد عفونی کننده وسیع الطیف چند منظوره
بر پایه فنل با عملکرد اختصاصی علیه کوکسیدیوز

UNIQUE
SOLUTION
FOR ALL
POLLUTION




یونی کوکسی کیل®

ترکیبات | هر یک لیتر از محلول حاوی:

کلروکرزول


۲۵۰ گرم



کوکسیدیوز یکی از جدی ترین بیماری های صنعت دام و طیور است که توسط تک یاخته Eimeria ایجاد می شود. شدت این بیماری به فاکتور های مختلفی از جمله سویه کوکسیدیا، تعداد اووسیت های خورده شده، سن، وضعیت سیستم ایمنی میزبان و کیفیت خوراک بستگی دارد. این بیماری موجب خسارات سنگین اقتصادی به صنعت دام و طیور در سراسر جهان می شود.

یونی کوکسی کیل® یک ضد عفونی کننده اختصاصی با فرمولاسیون منحصر به فرد می باشد که حاوی کلروکرزول (دارای تأییدیه از اتحادیه اروپا) است. این محصول علاوه بر اثر کشندگی بر انواع باکتری، قارچ و ویروس، علیه اووسیت های کوکسیدیا، کریپتوسپوریدیوم و انواع تخم کرم ها و تخم جرب قرمز طیور، هاگ باکتری ها و مایکوباکتریوم نیز مؤثر بوده و حتی در حضور مواد آلی و بیوفیلم کارایی خود را حفظ می کند.

کلروکرزول یک حلال لیپیدی است که از طریق لایه های سه گانه خارجی محافظت کننده پروتئینی، لیپیدی و کیتینی، وارد تخم انگل و اووسیت های کوکسیدیا می شود. همچنین یونی کوکسی کیل®، موجب از بین رفتن انگل های نابالغ می شود.



موارد مصرف

- ضد اوویسیست های کوکسیدیا
- قابل مصرف در فارم های مرغ گوشتی، مادر، پالت، تخم گذار تجاری و مزارع پرورش گوسفند، گاو و پرواربندی ها
- ضد باکتری (مانند سالمونلا، استافیلوکوک، انتروکوک، پروتئوس، سودوموناس و ...)
- ضد ویروس (مانند ویروس آنفلوانزای طیور، نیوکاسل و ...)
- ضد قارچ (مانند کاندیدا، اسپرژیلوس و ...)
- ضد تخم های جرب قرمز طیور
- ضد کریپتوسپوریدیوم
- ضد تخم کرم ها

مزایای یونی کوکسی کیل®

- فعال در دماهای پایین براساس آزمایشات انجام شده توسط (DEFRA) Department for Environment, Food and Rural Affairs
- فعال در حضور مواد آلی
- فاقد خاصیت خورندگی

مقدار و روش مصرف

میزان رقت و زمان تماس	موارد استفاده
رقت ۲٪ به مدت ۳۰ دقیقه	جهت ضد عفونی علیه انواع باکتری، ویروس و قارچ
رقت ۲٪ به مدت ۳۰ دقیقه	مصارف عمومی
رقت ۲٪ به مدت ۲ ساعت	جهت ضد عفونی علیه انواع تخم کرم ها
رقت ۳٪ به مدت ۱ ساعت	جهت ضد عفونی علیه کریپتوسپوریدیوم
رقت ۳٪ به مدت ۴ ساعت	جهت ضد عفونی علیه اوویسیست های کوکسیدیا
رقت ۳٪ به مدت ۲۴ ساعت	جهت ضد عفونی علیه تخم جرب قرمز طیور
رقت ۴٪ به مدت ۱ ساعت	جهت ضد عفونی علیه کلسترییدیوم
رقت ۴٪ به مدت ۳ ساعت	جهت ضد عفونی علیه مایکوباکتریوم
رقت ۲-۳٪	حوضچه های ضد عفونی

توجه:

جهت ضد عفونی سطوح بتنی و سایر سطوح صاف، حداقل ۱۰۰ میلی لیتر محلول رقیق شده یونی کوکسی کیل® به ازای هر متر مربع نیاز است.

✚ دستورالعمل مصرف یونی کوکسی کیل®

- یونی کوکسی کیل® با دستگاه های اسپری کننده معمول، دستگاه های شست و شوی با فشار یا اسپری کننده های کوله پشتی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
- قبل از مصرف باید جایگاه نگهداری حیوانات تخلیه شود و ضد عفونی در حضور حیوانات صورت نگیرد.
- قبل از اسپری ضد عفونی کننده، از خشک بودن سطوح مورد نظر اطمینان حاصل نمایید.
- قبل از ضد عفونی تجهیزات و لوازم، باید با آب شست و شو داده شده باشند.
- کلیه سطوح مورد ضد عفونی باید به طور کامل با یک شوینده مناسب قبلا شسته شده باشند.
- از پاک شدن کلیه مواد شیمیایی که قبلا مورد استفاده قرار گرفته اند، اطمینان حاصل نمایید.
- محلول ۲٪ - ۳٪ یونی کوکسی کیل® جهت اسپری تهیه شود. (می توان رقیق سازی را درون مخزن اسپری انجام داد).
- پس از مصرف یونی کوکسی کیل®، کلیه ی تجهیزات و قطعات پلاستیکی (مانند ابزار های فشار قوی و شلنگ ها) را با شوینده ی قلیایی رقیق شده بشوید.

✚ دستورالعمل جهت از بین بردن کوکسیدیا، تخم کرم ها و کریپتوسپوریديوم

- کف و دیوار ها را حداقل تا شعاع ۲ متر ضد عفونی نمایید.
- دیوار ها و سقف های بلندتر از ۲ متر در صورت نیاز باید ضد عفونی شوند.
- تمام قطعات و تجهیزات داخلی را ضد عفونی نمایید.

✚ دستورالعمل جهت از بین بردن جرب، ویروس و باکتری

- محوطه نگهداری حیوانات بطور کامل ضد عفونی شود.
- ساختمان و تجهیزات می بایست طبق جدول مقدار و روش مصرف ضد عفونی شوند.
- پس از خشک شدن ساختمان، تجهیزات را در محل خود قرار داده و سپس از سالن استفاده نمایید.


✚ تجهیزات اسپری فشار بالا

- فشار دستگاه اسپری را روی ۲۰ تا ۷۰ بار تنظیم نمایید تا در حین اسپری بر روی دیوارها، میزان محلول مورد استفاده را کاهش دهید.

✚ تجهیزات اسپری کوله پشتی

- از نازل اسپری با زاویه باز استفاده نمایید.

یک محلول ضد کوکسیدیوز مؤثر، نه تنها باید قادر به از بین بردن اووسیست های کوکسیدیا باشد بلکه باید موجب توقف اسپوروله شدن اووسیست ها نیز شود.



کارآمدی محصول یونی کوکسی کیل® براساس توانایی آن در لیز کردن دیواره سلولی و متوقف کردن اسپوروله شدن اووسیست ها (نمودار ۱ و ۲)



مطالعه دیگری نشان داد که این ترکیب با غلظت ۴٪ طی مدت ۶۰ دقیقه اووسیست ها را تقریباً به طور کامل از بین می برد، که این اثر بیشتر به از بین بردن اووسیست های غیر اسپوروله مربوط است. همچنین تحقیقات نشان داده است که:

- اووسیست های کوکسیدیا طی ۴ ساعت در غلظت ۳٪ یونی کوکسی کیل®، کاملاً از بین می روند.
- اووسیست های کوکسیدیا طی ۳ ساعت در غلظت ۴٪ یونی کوکسی کیل®، کاملاً از بین می روند.
- اووسیست های کوکسیدیا، در غلظت ۳٪ یونی کوکسی کیل®، پس از ۳ ساعت نمی توانند اسپوروله شوند.
- اووسیست های کوکسیدیا، در غلظت ۴٪ یونی کوکسی کیل®، پس از ۱ ساعت نمی توانند اسپوروله شوند.

استفاده از یونی کوکسی کیل® موجب به تاخیر انداختن مقاومت به داروهای ضد کوکسیدیوز می شود.

شرایط نگهداری

- محصول در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب بطری پس از هر بار استفاده کاملاً بسته شود.

احتیاطات

- وجود فرمالدهید یا آهن (مثل زنگ) حتی به میزان بسیار کم در آب می تواند موجب کریستاله شدن و رسوب کلروکرزول شود.
- هنگام استفاده از یونی کوکسی کیل®، با پوشش مناسب (دستکش، ماسک و عینک) از پوست و چشم محافظت گردد.
- از آشامیدن این محصول و استنشاق بخارات و ذرات اسپری آن پرهیز نمایید.
- این محصول برای پوست، چشم و غشاهای مخاطی حساسیت زامی باشد. در صورت تماس، بلافاصله با آب تمیز و فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی

بطری ۱ لیتری



Unicoccikill



تولید کننده: شرکت ویوا پارس
تحت لیسانس شرکت یونیکور اسپانیا

@vivapars
۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱