فلورنیک®

FLORNIQ10%

محلول آنتی‌بیوتیک خوراکی وسیع‌الطیف با ماده موثره فلورفنیکل از خانواده آمفنیکل‌ها



Effective
Control
Proven
Results

vivapars

UNIQCURE ADDITIVES +PHARMA

فلورنیک®



ترکیبات

هر یک لیتر از محلول حاوی:

فلورفنیکل	۱۰۰ گرم

موارد مصرف

پیشگیری و درمان درگیری‌های گوارشی و تنفسی ناشی از میکروارگانیسم‌های حساس به فلورفنیکل از جمله گونه‌های اکتینوباسیلوس، گونه‌های پاستورلا، گونه‌های سالمونلا و گونه‌های استرپتوکوک در طیور.

مزایا

- زیست فراهمی بسیار بالا معادل ۹۶/۵ %
- حجم قابل توجه انتشار دارو در بدن، در نتیجه برابر بودن مقدار بافتی و مقدار پلاسمایی آن
- فاقد مضرات و مخاطرات کلرامفنیکل
- اثربخشی بالاتر از کلرامفنیکل
- وسیع الطیف، موثر علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی در بیماری‌های باکتریایی طیور
- درمان عفونت‌های تنفسی طیور به علت توزیع بالای فلورفنیکل در دستگاه تنفس طیور
- قابلیت ارزیابی غلظت سرمی فلورفنیکل تا ۲۴ ساعت پس از مصرف خوراکی
- جذب خوراکی سریع و رسیدن به سطح بالای غلظت در بافت‌های بدن (ریه، کلیه، عضلات روده، قلب، کبد و طحال)
- ایمن بودن دارو به دلیل فاصله زیاد بین دز درمانی و دز سمی

مکانیسم اثر

فلورفنیکل در غلظت‌های پایین باکتریوستات است ولی در غلظت‌های بالا روی برخی گونه‌ها، اثر باکتریوسیدی دارد. این آنتی بیوتیک با ایجاد اختلال در فعالیت پپتیدیل ترانسفراز، سنتز پروتئین میکروبی را مهار می‌کند. از آنجا که تشکیل پیوند پپتیدی مهار می‌شود، سنتز پروتئین در ریبوزوم‌های پروکاریوتی و یوکاریوتی (میتوکندری) مهار شده و در نتیجه رشد باکتری متوقف می‌گردد.



مقدار و روش مصرف

روزانــه ۱ لیتر فلورنیک®۱۰ % در ۱۰۰۰ لیتر آب آشــامیدنی (معادل ۲۰ میلی گــرم فلورفنیکل خالص به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به مدت ۵ - ۳ روز متوالی

توجه:

- این محصول نیازی به رقیق‌سازی اولیه در مقدار کم آب ندارد. جهت جلوگیری از رسوب دارو در آب آشامیدنی، مقدار محاسبه شده از فلورنیک® ۱۰ % را مستقیماً به مخزن آب آشامیدنی اضافه نمایید.
- در طول دوره ی درمان، آب آشامیدنی حاوی دارو باید طی ۲۴ ساعت مصرف شود.
- مقدار و طول مدت مصرف تحت نظر دامپزشک تعیین گردد.

vivapars.com

منع مصرف

در طیور تخم‌گذاری که تولید آن‌ها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

دوره پرهیز از مصرف

گوشت طیور: ۵ روز

تداخل دارویی

از مصرف همزمان آنتی‌بیوتیک فلورفنیکل با سایر آنتی‌بیوتیک‌های خانواده پنی سیلین‌ها، ماکرولیدها و آمینوگلایکوزیدها پرهیز نمایید.

شرایط نگهداری

- محصول در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب بطری پس از هر بار استفاده کاملا بسته شود.



احتیاطات

- تحت نظر دامپزشک مصرف شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- عمر قفسه‌ای محصول در صورتی که در بسته‌بندی اصلی باشد، ۲ سال و در صورت باز شدن درب محصول ۲۸ روز می‌باشد.

بسته بندی

بطری ۱ لیتری

ORAL SOLUTION ANTIBIOTIC

تولید کننده: شرکت ویوا پارس

@vivapars

۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱