تیامفنیکیور® ۲۵%

Thiamphenicure 25%

محلول آنتی‌بیوتیک خوراکی وسیع‌الطیف با ماده موثره تیامفنیکل از خانواده آمفنیکل‌ها



vivapars

UNIQCURE ADDITIVES +PHARMA



تیامفنیکیور® ۲۵%

ترکیبات

هر میلی‌لیتر از محلول حاوی:

تیامفنیکل	۲۵۰ گرم

موارد مصرف

- **نیمچه‌های گوشتی:** درمان بیماری‌های باکتریایی مجاری تنفسی و گوارشی، بیماری مزمن تنفسی، کلی باسیلوز، کوریزای عفونی، درمان بیماری‌های عفونی با عامل انواع باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، ریکتزیا، کلامیدیا، انواع سویه‌های مایکوپلاسما، سویه های پاستورلا، سویه‌های استافیلوکوک، سویه‌های سالمونلا، اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال و کلستریدیوم پرفرنژنس.
- **بوقلمون:** درمان بیماری‌های عفونی با عوامل: سویه‌های سالمونلا، پاستورلا مولتی سیدا، اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال، استافیلوکوکوس اورئوس، کلستریدیوم پرفرنژنس، مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، مایکوپلاسما سینوویه، مایکوپلاسما مله آگریدیس.

مزایا

- عدم ایجاد کم‌خونی آپلاستیک
- دارای تاییدیه مصرف در طیور از اتحادیه ی اروپا (EMA)
- عملکرد مناسب علیه باکتری‌های مقاوم به سایر آنتی بیوتیک‌های گروه آمفنیکل
- وسیع‌الطیف، مؤثر علیه باکتری‌های هوازی، بی‌هوازی، گرم مثبت و گرم منفی
- قابل ارزیابی بودن غلظت سرمی تیامفنیکل تا ۲۴ ساعت پس از مصرف خوراکی در نیمچه‌های گوشتی
- جذب خوراکی سریع

مکانیسم اثر

تیامفنیکل، آنتی‌بیوتیکی سنتتیک و باکتریواستاتیک محسوب می‌شود. این آنتی‌بیوتیک جذب سلول‌های باکتریایی می‌شود و با اتصال به تحت واحد ۵۰ S ریبوزوم‌های ۷۰ S و ایجاد اختلال در فعالیت پپتیدیل ترانسفراز میکروبی، عمل می‌کند. از آنجا که تشکیل پیوند پپتیدی مهار می‌شود، پس سنتز پروتئین در ریبوزوم‌های پروکاریوتی مهار شده و در نتیجه رشد باکتری متوقف می‌گردد.



مقدار و روش مصرف

روزانه ۲-۱/۶ میلی‌لیتر محلول تیامفنیکیور® ۲۵% به ازای ۱۰ کیلوگرم وزن زنده ی بدن (معادل ۵۰-۴۰ میلی‌گرم تیامفنیکل به ازای هر کیلوگرم وزن زنده ی بدن) به مدت ۵ - ۳ روز متوالی به روش خوراکی به همراه آب آشامیدنی.

نکته:

- غلظت محلول آماده شده نباید از ۸۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی کمتر و از ۱۲۵۰ میلی لیتر بیشتر باشد.
- این محصول نیازی به رقیق سازی اولیه در مقدار کم آب ندارد. جهت جلوگیری از رسوب دارو در آب آشامیدنی، مقدار محاسبه شده از تیامفنیکیور® ۲۵% را مستقیماً به مخزن آب آشامیدنی اضافه نمایید.
- مقدار و طول مدت مصرف تحت نظر دامپزشک صورت گیرد.

vivapars.com

منع مصرف

- در حیوانات با آسیب ها و مشکلات کلیوی مصرف نشود.
- در طیور تخم گذار که تولید آن ها مصرف انسانی دارد، مصرف نشود.

دوره پرهیز از مصرف

- نیمچه گوشتی: ۴ روز
- بوقلمون: ۶ روز

تداخل دارویی

از مصرف همزمان آنتی‌بیوتیک تیامفنیکل با آنتی بیوتیک‌های خانواده پنی سیلین‌ها، سفالوسپورین‌ها و آمینو گلایکوزیدها پرهیز نمایید.

شرایط نگهداری

- محصول در دمای اتاق و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- درب بطری پس از هر بار استفاده کاملا بسته شود.

احتیاطات

- تحت نظر دامپزشک مصرف شود.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- عمر قفسه ای محصول در صورتی که در بسته بندی اصلی باشد، ۲ سال و در صورت باز شدن درب محصول ۲۸ روز می باشد.

بسته بندی

بطری ۱ لیتری



ORAL SOLUTION ANTIBIOTIC

تولید کننده: شرکت ویوا پارس

@vivapars

۰۲۱-۶۶۱۲۱۱۳۱